

InBody

See what you're made of

----- 施設・店舗情報 -----

企画・制作

株式会社インボディ・ジャパン


〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル

Tel:03-5875-5780 Website:<https://www.inbody.co.jp>



本書の内容の一部または全てを無断でコピーしたり、他の媒体（磁気、電気、写真等の如何を問わず）や他システムに転用したりすることを禁じます。

QRコードを読み取ると、製品紹介や結果用紙の見方をYouTubeで見ることができます。



InBody測定は、体を構成する基本成分である体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪を定量的に分析し、栄養状態に問題がないか、身体はバランスよく発達しているかなど、人体成分の過不足を評価する検査です。InBody測定は手軽で正確に部位別の筋肉量・体脂肪量の変化が把握でき、この情報は食習慣・活動量など生活習慣の改善や各種治療の効果を確認するための重要な情報になります。

生活習慣の「良い」・「悪い」は 体成分の変化に表れます。



まずは測定結果を知ることから始めてみませんか？


体成分履歴

	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
体重 (kg)					
筋肉量 (kg)					
体脂肪率 (%)					
InBody点数					
	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
体重 (kg)					
筋肉量 (kg)					
体脂肪率 (%)					
InBody点数					
	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
体重 (kg)					
筋肉量 (kg)					
体脂肪率 (%)					
InBody点数					

メタボリック症候群とは？

体脂肪量は腹部を中心に溜まりやすいです

メタボリック症候群は内臓脂肪症候群とも呼ばれます。つまり、内臓脂肪が蓄積することによって高血圧や糖尿病、脂質異常症（高脂血症）などの生活習慣病が重なった状態を示します。体脂肪は体に予備のエネルギーを保存しますが、多過ぎると糖尿病等の原因となり、動脈硬化を引き起こします。



体脂肪は体幹に溜まりやすく、体幹の体脂肪量は内臓脂肪量に比例しますが、努力次第で減らしやすい成分でもあります。そのため、メタボリック症候群を改善・予防するには過食になりがちな食生活を改めて、積極的に体を動かし適度な運動を日常生活に取り入れることが重要となります。

適切な体脂肪量は健康な生活を支えます

体脂肪が多いと健康に良くありませんが、極端に少なすぎることも望ましくありません。適切な量を維持することが健康を保つうえで重要になります。

肥満が原因で起こる病気・症状



- ・生活習慣病
- ・関節の負担
- ・睡眠無呼吸症

痩せ過ぎが原因で起こる病気・症状




- ・体温や免疫力の低下
- ・骨粗鬆症のリスク増加
- ・女性の場合、ホルモン分泌に悪影響

.....
予防するには、先ず体成分を正確に評価する必要があります

体成分分析装置InBody

InBodyはどのようにして体成分を測定するのか？

水分を含む筋肉には電気が流れやすく、体脂肪は電気が流れにくい性質があります。InBodyは体内に微弱な電気を流し、その際に発生する抵抗値(インピーダンス)から体の水分量をはじめとする各成分を算出します。また、インピーダンスは四肢と体幹の部位別に計測され、体水分量や筋肉量・体脂肪量の情報は部位別に提供されます。




体幹のインピーダンスを測定する場合

- ① 左腕から左脚に電気を流します。
- ② 右腕から右脚の電圧を測定します。
- ③ 電流と電圧が重なる体幹のみのインピーダンスが分かります。このように電気を流す範囲と電圧の測定する範囲を変えることで、部位別のインピーダンスが測定できます。

左脚のインピーダンスを測定する場合




左腕のインピーダンスを測定する場合



インピーダンスを使って体成分を求める方法をBIA法(生体電気インピーダンス分析法)と言い、安全で簡単な方法であることから、その基本原理は家庭用体組成計でも広く用いられています。主に医療・臨床研究で使用されるInBodyは測定の精度を上げるために、部位別測定の他にも多周波数分析・8点接触型電極などの技術を採用しています。

正しい測定姿勢

正確な測定を行うためには、測定時に正しい姿勢を維持する必要があります。下記の内容を確認してから測定してください。



※ イメージは立位タイプの測定姿勢です。仰臥位タイプのInBodyは①～④にご注意ください。

- ・測定中は動いたり、話したり、咳やくしゃみをしないでください。
- ・裸足で測定してください(靴下やストッキングでは測定結果が不正確に出ます)。
- ・手や足が乾燥している方は、ウェットティッシュなどで電極に接する部位(特に足)を十分に拭いてから測定してください。



測定前の注意事項

心臓ペースメーカーを
装着されている方は
測定できません

心臓ペースメーカーのような植え込み型医療機器を装着されている方は、測定しないでください。測定中に微弱な電流が体内に流れるため、装置の故障、生命の危機に繋がる恐れがあります。

トイレを済ませた後に
測定しましょう

膀胱内や腸内の残余物は体重に影響して体脂肪として見なされるため、測定結果が不正確になる可能性があります。測定前はトイレを済ませてから測定してください。

お風呂やシャワー、運動
の前に測定しましょう

入浴や運動によって発汗したり、血流が変化したりすると、体成分が一時的に変化する可能性があります。測定時は身体を安静な状態にしてから測定してください。


空腹状態で測定する
ことが理想です

胃腸内の物は体脂肪として見なされません。測定結果の精度を上げるためには食前に、食後の場合は胃腸の動きが落ち着く2時間程経過してから測定してください。

分子レベルの体成分分析

体成分分析の方法には様々な観点があります

人体は何でできているか?と考えた時に、原子・分子・細胞・組織など様々な観点から分析することができますが、InBodyは体水分量が他の成分を求める基になるため、分子レベルの分析を採用しており、人体を大きく4つの成分(体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪)に分けます。



※ 表示している%は人種や年齢に関係しない、標準体重における理想的な体成分の割合を意味します。

体水分量は更に細胞膜の中に存在する細胞内水分量と、血液や間質液などに存在する細胞外水分量に分けられます。ミネラル量は更に骨を構成する骨ミネラル量と、僅かでありながら筋肉を構成する骨外ミネラル量に分けられます。

体成分分析 *Body Composition Analysis*

人体を4つの構成成分に分けて評価します

体を構成している体成分の測定結果です。人の体は大きく分けて体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪で構成されており、これらの均衡がとれている時に、健康な状態と言えます。



筋肉量は体水分とタンパク質の融合体であり、随意筋の骨格筋だけではなく、内臓筋や心臓筋も含まれる筋肉組織の総量を意味します。除脂肪量は体重から体脂肪を除いた値を意味します。

体成分で分かる体の黄色信号

身体の「信号」はとても微弱なもので、特に異変を感じなかったり、日々の忙しさで見落としてしまったりすることがあります。体成分は体の状態や疾患を反映するものさしになるので、定期的に測定すると共に生活習慣を見直すきっかけになります。

タンパク質の不足

基礎代謝や免疫力の低下につながります。



体脂肪の過多

生活習慣病の要因になります。



ミネラルの不足

骨折や骨粗鬆症の要因になります。



水分均衡の崩れ

むくみや栄養不良と関係します。



よくある質問

Q4 正確な身長が分かりませんが、適当に入力しても大丈夫ですか？


A. 身長は測定値に影響を及ぼすため、正確に入力する必要があります。身長は伝導体の長さとして使用されるので、実際の身長と入力した身長の差が大きくなるほど、算出される体成分の誤差も大きくなります。※体成分を正確に測定するためには、身長だけでなく体重も正確な値が必要です。余分な重さは体脂肪量として反映されるので、体重測定時はできるだけ軽装で測定してください。

Q5. 測定結果がおかしいです。毎回少し差が出ますが正しい結果ですか？

A. 新陳代謝によって体水分は常に体内を循環するので、InBodyで連続測定しても0.1kg程度の僅かな差が出ることがあります。しかし、殆どの方は測定中に動いたり、しゃべったり、測定姿勢を正しくしなかったことで発生する誤差であり、測定時に注意事項を守って正しい姿勢を維持すれば、測定時点の最も正確な体成分の結果が得られます。また、手足が乾燥している場合は測定エラーが出たり、異常なインピーダンスが計測されることがありますが、その際は電極に接する部位(特に足)を十分に濡らしてから測定してください。

Q6. どうしても太ももがくっついてしまっていますが、結果に影響はありませんか？

A. 太ももがくっついたり、腕が体に接したりすると、各部位を流れる電流の流れが変わるため、結果に影響を及ぼします。どうしても太ももがくっついてしまう場合は、太ももの間に電気の流れないものを挟んで測定してください。



Q1. 各項目の標準値・標準範囲はどのように決まりますか？


A. InBodyが提供する標準は理想値 (Ideal Value)を意味します。つまり、ある集団の統計から求めた平均値と比べて多い少ないではなく、人種・年齢・体型に関係せずに体成分の均衡を維持するための、標準体重を基準に持つべき理想的な量を意味します。例えば、血圧を測定するときに年齢別の平均値を基準に高血圧・低血圧を評価しないことと同じです。参考までに標準体重は身長と標準BMI(男性=22、女性=21を適用)から求めます。

Q2. InBodyと家庭用の体組成計で体脂肪率が違うのはなぜですか？

A. InBodyは主に医療や研究目的で使用される精密機器ですが、家庭用の体組成計は健康な方における大体の体成分の傾向のみが把握できる簡易的なものであり、入力した性別・年齢から推定される統計的な体成分とずれが大きいほど、その誤差も大きくなります。そのため、同じ項目で異なる結果が得られた場合は、InBodyによる体成分が最も正確な基準と言えます。

Q3. 筋肉量と骨格筋量、部位別筋肉量の合計の値が一致しないのはなぜですか？

A. InBodyが測定する筋肉量は、体水分量とタンパク質の集合体であり、骨格筋・心臓筋・内臓筋などを全て含む概念ですが、骨格筋量は自分の意思で動かせる随意筋のみを意味しており、筋肉量の中に含まれます。部位別筋肉量は、上記の説明における筋肉量を意味しますが、首から上の筋肉量を評価していないため、同じ数値になりません。



筋肉・脂肪 *Soft Lean-Fat Analysis*

筋肉と脂肪のバランスはとても大切です

体重だけで肥満であるかどうかを決めるのではなく、筋肉量と体脂肪量の均衡度合を判断することが重要です。

身長:180cm
体重:80kg
体脂肪率:15%

身長:180cm
体重:80kg
体脂肪率:40%

筋肉

脂肪


筋肉

脂肪

同じ身長と体重の人でも筋肉と脂肪の割合によって体型は大きく異なります。Aのように筋肉量が多い体型は、たとえ体重が重くても肥満ではなく、体重を減らす必要はありません。しかし、Bのように体脂肪量の多い体型は生活習慣を見直し、体脂肪量を減らす一方、筋肉量は増やす必要があります。このように、筋肉と脂肪の均衡を見ることで、外見だけでは分りにくい測定者の体のタイプを簡単に判断することができます。

体脂肪率が高いと太って見える理由

同じ重量の筋肉と脂肪を比べると、脂肪の体積が約1.2倍大きいので、同じ体重でも脂肪の割合が高い人の方が太って見えます。つまり、脂肪を減らして筋肉を増やせば体重が重くなくても見た目は引き締まることとなります。




※ 筋肉と脂肪は同じ重量でも体積が異なります。

部位別体脂肪量 Segmental Fat Analysis

体脂肪は少なすぎても多すぎても体に良くありません

脂肪と聞くと嫌なイメージが先行してしまうかもしれませんが、体脂肪は体内でエネルギー源の他にも様々な役割をする必須成分です。





GREAT **標準体重・強靱型**

体重と体脂肪量は標準で筋肉量の多い、運動選手でみられる理想的な体型です。この状態を維持することが最善と言えますが、過度に体脂肪が少ないと体によくありません。

GOOD **標準体重・健康型**

体重・筋肉量・体脂肪量の全てが標準で、体成分の均衡が取れている状態です。今でも十分に健康的な体型ではありますが、筋肉量を増やすことで、より理想的な体型になります。




BAD **標準体重・肥満型**

標準体重ですが、筋肉量と体脂肪量の均衡が取れていない隠れ肥満体型です。運動不足の現代人に多くみられる体型で、見た目は普通ですが、筋肉量と体脂肪量は改善が必要です。

BAD **過体重・虚弱型**


筋肉量は標準ですが、体脂肪量の割合が高いため、現在の筋肉量では体を支え切れない、虚弱に該当する体型です。筋肉量を維持しながら、体脂肪量を減らすことが必要です。




体脂肪量は筋肉量に比べて体重を占める割合が少ない反面、運動や食事調整など努力によって比較的簡単に減らすことができ、油断すると短期間で増えることもあります。InBodyではこのような体脂肪量の特徴から、その標準範囲(80~160%)を筋肉量に比べて広く設定しています。

部位別筋肉量は筋肉・脂肪項目の筋肉量と評価基準が異なるため、両方の評価が必ず一致するわけではありません。例えば、測定者の筋肉量が標準体重からみて多くても、現在の体重を支えきれない量であれば、部位別筋肉量では「低」と評価されます。これとは逆に筋肉の絶対量が少なくても、現在の体重を支えられる量であれば部位別筋肉量では「標準」、または「高」と評価されます。


過体重の肥満体型で多いタイプ




筋肉量が標準値(ピンクの破線)を越えていますが、右図の部位別評価では「低」と評価されています。標準体重基準では筋肉量は標準ですが、現在の体重基準にすると支えきれない(不足している)ことがわかります。



低体重の健康体型で多いタイプ




筋肉量が標準値(ピンクの破線)を越えていないため、一見少ないように見えますが、現在の体重基準で評価すると、十分発達していることがわかります。




このようにInBodyは、部位別筋肉量を評価する際に現在体重に対して適切かどうかを考慮することで、過体重での筋肉量の過大評価及び低体重での筋肉の過小評価を防止しています。

グラフの早見表



GREAT 過体重・強靱型

ボディビルダーなどにみられる体型です。体重が重いのは筋肉量が多いため、肥満が原因ではありません。今の体重が適正体重と言え、過体重を意識して減量する必要はありません。



BAD 過体重・肥満型

筋肉量が多いですが、安心してはいけません。体脂肪量の増加によって、体重を支えるために自然と筋肉量も増加します。筋肉量を維持しながら体脂肪量を減らすことが必要です。



BAD 低体重・虚弱型

体重・筋肉量・体脂肪量の全てが少ない虚弱体型です。適切な食事で身体活動に必要なエネルギーが十分に供給されていない恐れがあり、何よりも先に体重を増やすことが必要です。




GOOD 低体重・強靱型

低体重ですが筋肉量は標準に属しているため、体成分の均衡が取れています。しかし、体脂肪量が過度に少ないと、ホルモン異常などの問題が出る恐れもあるので、注意が必要です。


あなたの体型はどれに該当しますか？

BMIと体脂肪率を組み合わせることで体型を評価します。BMIは体重のみの評価なので、体脂肪率と組み合わせることで実際に近い体型がわかります。*




筋肉量だけでなくバランスも重要です

腕・体幹・脚の筋肉量を分析します。筋肉量は普段のエネルギー摂取量や活動量によって変動するため、栄養状態やリハビリなど運動効果をそのまま表す項目です。



上半身(右腕・左腕)に比べて下半身(右脚・左脚)の筋肉量が少ないと右の図のようなイメージになります。このような結果は、加齢や病気、運動不足等の事例でよく見られ、サルコペニア(筋肉減少症)の典型的なパターンでもあります。



右脚と左脚を比較した結果です。筋肉量の少ない上に左右の均衡に差があると、体の重心が傾いて転倒のリスクが高まると共に、腰痛や関節痛などの原因にもなります。

